

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

SOLUPRICK Positieve controle, 10 mg/ml, oplossing voor huidpriktest Histamine dihydrochloride

EN

SOLUPRICK Negatieve controle, oplossing voor huidpriktest

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

- *Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen*
- *Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*
- *Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*

In deze bijsluiter

- 1. Wat is Soluprick en waarvoor wordt het gebruikt**
- 2. Wat u moet weten voordat u Soluprick gebruikt**
- 3. Hoe wordt Soluprick gebruikt**
- 4. Mogelijke bijwerkingen**
- 5. Hoe bewaart u Soluprick**
- 6. Aanvullende informatie**

1. Wat is Soluprick en waarvoor wordt het gebruikt

Soluprick is een oplossing voor de huidpriktest.

Soluprick Positieve controle en Soluprick Negatieve controle worden alleen voor diagnostiek gebruikt. Ze worden gebruikt in de huidpriktest om vast te stellen welke stoffen bij u een allergische reactie veroorzaken.

Soluprick Negatieve controle zal geen reactie veroorzaken. De histaminedihydrochloride in de Soluprick Positieve controle veroorzaakt, bij een positieve reactie, een harde gezwollen plek op de huid, die omgeven kan zijn door een rood gebied. Dit toont de arts dat de huidpriktest werkt. Deze test is in het bijzonder belangrijk als u geneesmiddelen heeft gebruikt die de reactiviteit van de huidpriktest verminderen zoals antihistaminica, sommige antidepressiva of sterk werkzame lokale steroïde preparaten.

2. Wat u moet weten voordat u Soluprick gebruikt

Gebruik Soluprick Positieve en Negatieve controle niet

- als u eerder een nare reactie heeft gehad bij gebruik van dit product of een ander product welke histaminedihydrochloride bevatte of een ander bestanddeel in de oplossing.
- als u huidproblemen heeft in het gebied waar de huidpriktest moet worden verricht
- als u overgevoelig bent voor fenol.

Informeer uw arts als één van deze omstandigheden voor u van toepassing is.

Wees extra voorzichtig met Soluprick Positieve en Negatieve controle

Sommige omstandigheden kunnen het resultaat van de huidpriktest beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat u, voordat de huidpriktest wordt verricht, aan uw arts of gezondheidsmedewerker meldt of één van de volgende aandoeningen voor u van toepassing is.

- U lijdt aan eczeem in een actief stadium of andere huidziekte in het gebied waar de huidtest moet plaatsvinden
- Er is bij u een lymfeknoop verwijderd onder de oksel.
- Uw algemene conditie is sterk verzwakt door een ziekte.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of gezondheidsmedewerker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort gelden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Sommige geneesmiddelen kunnen het resultaat van de huidpriktest beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat, voordat de huidpriktest wordt verricht, u aan uw arts of gezondheidsmedewerker meldt of u een van de volgende geneesmiddelen heeft gebruikt.

- kortwerkende antihistaminica gedurende de afgelopen 2 tot 3 dagen;
- langwerkende antihistaminica gedurende de afgelopen 8 weken;
- geneesmiddelen die hydroxyzine bevatten gedurende de afgelopen 2 weken;
- geneesmiddelen die ketotifen bevatten gedurende de afgelopen 2 weken;
- tricyclische antidepressiva gedurende de afgelopen 2 weken;
- corticosteroïden (steroïden) in een dosis minder dan 30 mg prednison of prednisolon per dag gedurende langer dan 1 week;
- glucocorticoiden (steroïden) in een dosis hoger dan 10 mg prednisolon per dag;
- sterk werkzame lokale steroïden die de laatste twee tot drie weken op de huid zijn gebracht.

Zwangerschap en borstvoeding

In het geval van zwangerschap, vraag uw arts, apotheker of gezondheidsmedewerker voor advies voordat een huidpriktest wordt verricht.

Een huidpriktest kan worden uitgevoerd bij vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Soluprick Positieve en Negatieve controle hebben, voor zover bekend, geen negatief effect op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

3. Hoe wordt Soluprick gebruikt

Uw arts of gezondheidsmedewerker zal de huidpriktest bij u verrichten. De procedure gaat als volgt:

- De huidpriktest wordt gewoonlijk op de binnenzijde van de onderarm uitgevoerd. Een andere mogelijkheid is dat de test op uw rug wordt gedaan.
- De huid moet droog en schoon zijn en kan worden gedesinfecteerd met alcohol door de arts of verpleegkundige.
- Een druppel van de testoplossing, Soluprick Positieve controle en Soluprick Negatieve controle, wordt op de huid gebracht op voldoende afstand van elkaar.

- De arts of verpleegkundige prikt met een ALK lancet door de druppel in de bovenste laag van de huid.
- Na 15 minuten wordt de reactie afgelezen. Een positieve reactie is een kleine bleke zwelling of bult (kwaddel) met een rode rand.

Wanneer u te veel van Soluprick Positieve controle en Soluprick Negatieve controle heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Soluprick bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Soluprick Positieve Controle zal de verwachte lokale effecten tonen die worden veroorzaakt door histamine. De positieve controle zal een harde gezwollen plek op de huid veroorzaken, welke omgeven kan zijn door een rood gebied met plaatselijk jeuk. In sommige gevallen kan een lichte lokale pijn optreden.

Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In zeer zeldzame gevallen kan een anafylactische reactie (een ernstige reactie van het lichaam die zich uit in zwellingen, jeuk, moeite met ademen en flauwvallen) ontstaan na de huidpriktest met actieve allergenen. Indien dit gebeurt, heeft uw arts of gezondheidsmedewerker, als eerste hulp, een noodbehandelingsset beschikbaar met een adrenalinespuit, die klaar is voor gebruik.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/ 40

B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Soluprick

- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- De praktijk/kliniek zal de huidpriktest oplossing bewaren.
- Bewaren in de koelkast (2°C–8°C).
- Gebruik Soluprick niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het label en vouwdoos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

- Na opening kan dit product nog maximaal 6 maanden worden bewaard.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Het werkzame bestanddeel in Soluprick Positieve controle is histaminedihydrochloride 10 mg/ml. Er zit geen werkzame bestanddeel in Soluprick Negatieve controle.

De andere bestanddelen zijn glycerol, fenol, dinatriumfosfaat dihydraat, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, natriumchloride, natriumhydroxide, zoutzuur en water voor injectie.

Hoe ziet Soluprick er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Soluprick zit in een glazen injectieflacon die 2 ml heldere oplossing bevat. De flacon is afgesloten met een rubber dop en een schroefdop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm
Denemarken

Fabrikant:
ALK-Abelló S.A.
Miguel Fleta 19
E-28037 Madrid
Spanje

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder volgende namen:

Soluprick Positive control, Soluprick Negative control

Registratienummer:

Soluprick Positieve controle; BE 456266
Soluprick Negatieve controle; BE 456275

Afleveringswijze : Medisch voorschrift

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: 06/2014